

# RIETZWENKGRAS

*Festuca arundinacea* Schreb.

## EIGENSCHAPPEN



- **Meerjarige** grassoort met goede persistentie
- Gemiddeld **20 tot 30 % hogere opbrengsten**, tot 45% in droge jaren, relatief t.o.v. Engels raaigras
- **Verteerbaarheid** ligt **10% punten lager** in vergelijking met Engels raaigras
- Bestand tegen zowel droogte als vocht/overstromingen
- Geschikt voor (intensief) **maaïen en beweiding** (jongvee)
- Trage beginontwikkeling
- Diepe worteling

## BOTANISCHE KENMERKEN



- Brede **stugge bladeren**
- Zeer kort, groenachtig tongetje, grote oortjes met wimpers
- Bovenkant blad is sterk geribd, onderkant glanzend
- Doorschietdatum 30/04 tot 10/05 voor rietzwenkgras; 10/05 tot 5/06 voor Engels raaigras

## ZAAIEN



- **Alle bodemtypes**, van nature eerder zwaardere voedselrijke gronden
- **Najaarszaai** te verkiezen boven voorjaarszaai
- Ideaal als **mengteelt met rode en witte klaver**
- 35 kg/ha (+ 7 kg/ha rode klaver + 3 kg/ha witte klaver)

## OOGST



- Idealiter de eerste snede 1 tot 2 weken voor het Engels raaigras
- **Droogt sneller**: als laatste maaien, niet schudden, laatst harken, eerst inkuielen
- Goed aanrijden
- Aan te raden in balen te persen als droge stof toch te hoog is

## RANTSOEN



- **Vers**: begrazing met jongvee/vleesvee
- **Ingekuild**: jongvee + vleesvee + melkvee
  - Bij een hoog aandeel kan droge stof opname (-5%) en productie dalen (-8%)